

Studienübersichten

AGO-OVAR 2.29

Atezolizumab in Kombination mit Bevacizumab und Chemotherapie versus Bevacizumab und Chemotherapie bei rezidiviertem Ovarialkarzinom – eine randomisierte Phase III Studie

Nacoprad

Prospektiv randomisierte, multizentrische Studie zum Vergleich der radikalen Hysterektomie nach neoadjuvanter Chemotherapie versus einer primären Radiochemotherapie bei Patientinnen mit einem Zervixkarzinom der Figo-Stadien IB2 und IIB

AdaptCycle

Frühes HER+/HER2-Mammakarzinom

Sascia

Phase-III –Studie bei Frauen mit frühem HER2-negativ Brustkrebs.

PRO B

Patientinnen mit metastasiertem Mammakarzinom und Behandlung in teilnehmendem Brustkrebszentrum.

Axana

Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Bewertung verschiedener Leitlinienkonformer Operationsverfahren in der Axilla nach neoadjuvanter Chemotherapie.

Destiny

demnächst

TMMR

Nicht-interventionelle, prospektive Beobachtungsstudie zur Behandlung des Cervixkarzinoms der Stadien FIGO Ib bis IIa durch nervenschonende totale Mesometriale Resektion und therapeutische Lymphonodektomie nach Höckel

Score

Dokumentation der Lebensqualität unter der Einnahme von Ovostat

Detect V

Eine multizentrische randomisierte Phase II Studie zum Vergleich einer Chemo- versus endokrinen Therapie in Kombination von Herceptin/Perjeta bei Patienten mit Her2 pos. und hormonrezeptorpositivem metastasiertem Brustkrebs.

INCYT

demnächst

Targit C

geschlossen

GeparDouz

geschlossen

Adapt

geschlossen

Insema

geschlossen

DUO-O

geschlossen